

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi di RSPAD Gatot Soebroto, dapat disimpulkan sebagai berikut:

4. Tidak terdapat pengaruh signifikan stadium dari penyakit yang diderita terhadap depresi yang dialami oleh pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi di RSPAD Gatot Soebroto.
5. Diperoleh prevalensi pasien kanker payudara yang masuk ke dalam kategori normal atau tidak depresi yaitu sebanyak 31 orang (86.1%), depresi ringan 1 orang (2.8%), depresi sedang 2 orang (5.6%), dan depresi berat 2 orang (5.6%).

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan pada penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melibatkan sampel yang lebih besar.
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan desain longitudinal untuk memantau perubahan tingkat depresi pada pasien sepanjang proses kemoterapi.
3. Menambahkan instrumen penelitian lain seperti kuesioner demografi untuk mengevaluasi kondisi demografi responden yang dapat menjadi faktor lain yang berpengaruh terhadap kejadian depresi.
4. Penelitian dilanjutkan dan dikembangkan dengan menggunakan variabel lainnya agar dapat mengeksplorasi faktor lain yang mungkin mempengaruhi depresi seperti psikososial, status ekonomi, dan periode menjalani kemoterapi.